ESCOLA BÁSICA 2, 3 PÊRO DE ALENQUER

EB 2,3 Pêro de Alenquer

Habitat Ribeirinho do Rio de Alenquer

No caudal hídrico do rio é possível observar algumas espécies como:



Galinha-d´água

(Gallinula chloropus)

Conhecida pelo nome comum de galinha-d'água, é uma ave da família Rallidae, ordem Gruiformes.

A galinha-d'água mede aproximadamente 37 centímetros de comprimento. Apresenta um escudo facial vermelho, faixas brancas nos flancos, plumagem negra e patas amarelas. Os imaturos são castanho-escuros com abdome mais claro, sem o escudo facial vermelho.

Alimenta-se de uma grande variedade de material vegetal, além de pequenos animais aquáticos. Tem como habitat os lagos, lagoas, canais, pântanos e também lagunas salobras. Trata-se duma ave migratória, deslocando-se para Norte, durante o inverno.

EB 2,3 Pero de Alenquer

Pato-bravo

(*Anas platyrhynchos*)



O pato-real é uma ave habita áreas temperadas e subtropicais da América do Norte, Europa e Ásia. Sendo uma espécie migratória, frequenta também as regiões da América Central e Caraíbas e foi introduzido em várias regiões, desde a Austrália e Nova Zelândia até países da América do Sul (entre os quais o Brasil).

Os indivíduos do sexo masculino possuem uma cabeça verde e anel branco no pescoço e asas, enquanto que as fêmeas possuem sobretudo plumagem de cor acastanhada. Também é possível observar em ambos os sexos um espelho alar, frequentemente de cor azul nos machos. Vivem em zonas húmidas e são omnívoros, alimentando-se de plantas aquáticas e pequenos animais. Por serem animais sociais, unem-se em bandos de tamanho variável.

EB 2,3 Pero de Alenquer

Corvo-Marinho-De-Faces-brancas

EB 2,3 Pero de Alenquer

Enguia-europeia ou de água-doce

(Anguilla anguilla)



Distribui-se pela costa atlântica da Europa e Norte de África, assim como por algumas ilhas do Atlântico e ainda em toda a costa do Mar Mediterrâneo. Em Portugal, em ambiente dulçaquícola, pode ocorrer em qualquer rio ou ribeira, durante todo o ano.

Tem dietas distintas durante as diferentes fases da vida. Os adultos têm uma dieta bastante diversificada, alimentam-se de vários insetos, larvas, vermes, minhocas, moluscos (polvo-comum), crustáceos e também pequenos peixes.

Tem o corpo alongado, serpentiforme. A sua maxila inferior ultrapassa ligeiramente a superior. Tem dentes pequenos, dispostos em várias séries nas maxilas. A sua coloração é variável: os adultos são castanho-esverdeado no dorso e amarelado no ventre, mudando para negro no dorso e prateado no ventre, com a maturidade sexual.

Espécie catádroma: vive em ambientes de água doce, mas reproduz-se em ambientes de água salgada. Pode viver até 15 anos nos rios, até regressar ao mar para se reproduzir, onde os adultos irão morrer após a desova.

As maiores ameaças são os elevados níveis de exploração (pesca), que é ilegal em território nacional (com exceção do Rio Minho) e a poluição dos rios.

EB 2,3 Pêro de Alenquer

O corvo-marinho-de-faces-brancas

(*Phalacrocorax carbo*)

é uma ave da ordem dos suliformes, com ampla distribuição geográfica. A espécie ocorre em todo o continente africano, Europa, Ásia central e do sul, Oceânia e América do Norte. Habita principalmente zonas costeiras, mas também pode ser encontrado em lagos interiores, áreas pantanosas e estruturas artificiais como barragens.

O corvo-marinho-de-faces-brancas tem aproximadamente 90 cm de comprimento e cerca de 150 cm de envergadura.

É uma ave de hábitos solitários, mas pode ser encontrada em grandes bandos em zonas ricas em alimento. O corvo-marinho-de-faces-brancas alimenta-se principalmente de peixes que pesca em mergulho, consumindo também anfíbios, crustáceos e moluscos.

O corvo-marinho-de-faces-brancas não se encontra em risco de extinção, embora algumas populações estejam ameaçadas por poluição e degradação de habitat, sobretudo junto de colónias de nidificação.

A garça-real-europeia ou cinzenta

(*Ardea cinerea*)

A **garça-real-europeia** é uma garça da Europa cuja aparência é a de uma ave com dorso cinza e faixa superciliar negra que se estende até as longas penas nucais.

É a garça mais abundante e difundida da Europa. Possui um comprimento de cerca de 95 cm, uma envergadura de 185 cm e peso de 1,6 a 2 kg. Pode viver cerca de 25 anos. Apresenta pernas altas, pescoço longo e bico longo e afilado. Os juvenis apresentam cores mais claras, dorso cinzento acastanhado e ventre branco raiado de negro e não possuem penacho. Atingem a maturidade aos dois anos de idade.

Pode ser encontrada normalmente em extensões de água doce com pouca profundidade e também em costas marítimas. Muitas vezes partilha o *habitat* das cegonhas.

Alimenta-se principalmente de peixes, mas não despreza batráquios, répteis, pequenos mamíferos, insetos ou moluscos terrestres e aquáticos. Digere bem as espinhas mas regurgita os pelos dos roedores na forma de bolas.