

## **Características do Mocho-d'orelhas**

### **Nome científico: *Otus scops***

O mocho-d'orelhas é a ave de rapina noturna mais pequena que existe em Portugal. O disco facial é castanho-acinzentado e os olhos são amarelos. Tem “orelhas” pouco visíveis em repouso. A plumagem parece uniforme, com tons que variam entre o castanho e o cinzento, com uma linha branco-acinzentada nos ombros. Quando observado de perto, nota-se um padrão complexo de riscas e manchas pretas, pintas brancas difusas e manchas arruivadas.

### **Localização ou Habitat**

Nos bosques pouco densos de árvores de folha caduca ou mistos, em edifícios ou parques urbanos e em pequenas matas junto a campos agrícolas. É mais abundante no interior Norte e Centro, sendo mais difícil de encontrar no resto do país.

### **Em que altura é possível observar este mocho**

De março a setembro. É uma espécie migradora nidificante em Portugal, que passa o inverno em África.

### **Orientações para o identificar**

Por vezes é confundido com o mocho-galego quando as “orelhas” não estão visíveis, mas é menor, mais esguio e acinzentado, e o seu voo é retilíneo, enquanto o voo do mocho galego é ondulante. A sua vocalização é muito parecida com a do sapo-parteiro-ibérico, mas é muito regular, enquanto a do sapo tem um ritmo mais inconstante e, por vezes, notas mais curtas. Ouça ambas abaixo para aprender a distingui-las.

Tal como a maioria dos membros da sua família, tem hábitos noturnos e só raramente se vê de dia. O seu canto monótono, que na Primavera se faz ouvir durante horas a fio, é geralmente a melhor forma de localizar esta espécie.