

Aves de Rapina Noturnas de Portugal

Nome	Nome científico	Características	Onde vive	Quando se observa
Coruja -das-torres	<i>Tyto alba</i>	Ave de tamanho médio com cara branca em forma de coração. O dorso é castanho-alaranjado com manchas cinzentas e o ventre pode variar entre o branco e o laranja. Tem corpo delgado, asas longas e patas compridas.	É uma espécie tipicamente associada a paisagens agrícolas abertas, podendo ocorrer também em montados pouco densos. Nidifica frequentemente em edifícios.	Durante todo o ano
Bufo-real	<i>Bubo bubo</i>	É a maior ave de rapina noturna europeia, com cabeça grande, cara castanha-acinzentada e olhos laranja-avermelhados. Tem bico preto, garras preto-acastanhadas e “orelhas” compridas bastante visíveis, exceto em voo. O ventre é castanho-amarelado com listas escuras, mais grossas no peito e mais finas no ventre, e a garganta é branca. O dorso é castanho-escuro com riscas e manchas pretas.	Tem preferência por habitats rochosos, longe das povoações, reproduzindo-se principalmente em escarpas.	Durante todo o ano
Mocho – d’orelhas	<i>Otus scops</i>	Ave de rapina noturna mais pequena que existe em Portugal. A cara é castanha-acinzentada e os olhos são amarelos. Tem “orelhas” pouco visíveis em repouso. A plumagem parece uniforme, com tons que variam entre o castanho e o cinzento, com uma linha branco-acinzentada nos ombros.	Nidifica em bosques pouco densos de árvores de folha caduca ou mistos, em edifícios ou parques urbanos e em pequenas matas junto a campos agrícolas	Entre março e setembro
Coruja-do-mato	<i>Strix aluco</i>	Ave de tamanho médio. A cara é normalmente arruivada ou acastanhada e os olhos são escuros. A plumagem varia entre o castanho-arruivado e o castanho-acinzentado, com riscas finas e manchas escuras. As asas são largas e arredondadas	Vive em áreas florestais, reproduzindo-se também em campos agrícolas com árvores, em jardins e cidades, tendo preferência por árvores velhas.	Durante todo o ano
Bufo-pequeno	<i>Asio otus</i>	Ave de tamanho médio com asas longas e estreitas. A cara é arredondada e castanho, com olhos cor de laranja. Tem “orelhas” compridas. A cor do dorso pode variar entre o castanho-acinzentado e o avermelhado, com manchas castanhas. O ventre é amarelado com listas escuras.	Nidifica geralmente em ninhos de outras aves de rapina e corvídeos, em florestas perto de áreas abertas, sobretudo pinhais.	Durante todo o ano
Coruja -do-nabal	<i>Asio flammeus</i>	A cara é castanha-pálido com manchas pretas à volta dos olhos amarelos. Tem “orelhas” pequenas. A plumagem varia entre o castanho-amarelado e o branco-amarelado, com listas bem marcadas. As asas são compridas e ligeiramente pontiagudas, com uma barra grossa e escura na ponta.	Não nidifica em Portugal onde só está no outono e inverno, sobretudo em zonas húmidas como estuários, lagoas e arrozais. Passa a primavera e o verão no norte e centro da Europa.	Entre outubro e março
Mocho -galego	<i>Athene noctua</i>	Ave de tamanho pequeno. A cabeça é grande e achatada, com sobranceiras oblíquas claras e olhos amarelos. O dorso é castanho com machas brancas evidentes e o ventre tem uma coloração mais esbranquiçada, sendo densamente listado de castanho.	Vive na proximidade do ser humano, reproduzindo-se em áreas abertas, em campos agrícolas, pequenas matas, vinhas, prados, jardins e montes de pedras.	Entre março e setembro