



Aves de rapina noturnas de Portugal

Em Portugal, podemos encontrar sete espécies de aves de rapina noturnas: cinco residentes (que permanecem todo o ano) coruja-das-torres (*Tyto alba*), coruja-do-mato (*Strix aluco*), bufo-pequeno (*Asio otus*), mocho-galego (*Athene noctua*) e bufo-real (*Bubo bubo*) e duas que só cá estão uma parte do ano: a coruja-do-nabal (*Asio flammeus*), invernante e o mocho-pequeno-d'orelhas (*Otus scops*), que chega na primavera para se reproduzir.

Estes animais pertencem à ordem das Strigiformes.

As aves de rapina noturnas precisam de espaços abertos e naturais para capturar o alimento. Por isso, existem em maior número nos meios rurais. Por vezes, podemos avistá-las/ ouvi-las em vilas ou cidades.

Em comum, as corujas, os mochos e os bufos têm os olhos na parte frontal, o que os ajuda a ver em profundidade. O seu principal sentido é a audição. Uma outra característica que se pode observar praticamente em todas as aves de rapina noturnas é que os ouvidos não estão no mesmo plano, existindo um ligeiro desnível. As suas asas permitem planar, quase sem movimento e o seu voo é muito silencioso, o que lhes permite surpreender as presas.

Estas amiguinhas são muito importantes para a agricultura, uma vez que se alimentam de roedores que estragam as culturas.



Coruja-das-torres (*Tyto alba*)



Mocho-galego (*Athene noctua*)



Coruja-do-mato (*Arix aluco*)



Bufo-pequeno (*Asio otus*)



Bufo-real (*Bubo bubo*)



Coruja-do-nabal (*Asio flammeus*)



Mocho-pequeno-d'orelhas (*Otus scops*)

Bibliografia

<https://gulbenkian.pt/jardim/read-watch-listen/da-coruja-das-torres-ao-mocho-galego-como-contribuir-para-a-conservacao-das-aves-de-rapina-noturnas/>

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thescottishcountryman.co.uk%2Fblog-posts%2Fbirds-of-prey-in-scotland-tawny&psig=AOvVaw2MCdanrHDeG1ZNKQX15xHD&ust=1717161553068000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=OCA8QjRxqFwoTCPjBhLW7tYYDFQAAAAAdAAAAABAE>

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.audubon.org%2Ffield-guide%2Fbird%2Flong-eared-owl&psig=AOvVaw0rB_zbQHcgDwCU8auOE5fu&ust=1717161633649000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=OCA8QjRxqFwoTCKKudu7tYYDFQAAAAAdAAAAABAE

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Uhu-3.jpg>

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.audubon.org%2Ffield-guide%2Fbird%2Fshort-eared-owl&psig=AOvVaw1D09LY6VrEED4uetqYrNEC&ust=1717161867002000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=OCA8QjRxqFwoTCNiutcq8tYYDFQAAAAAdAAAAABAE>

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstrirapinasnocturnas.wordpress.com%2Faves-rapina-nocturnas-portugal%2Fmocho-dorelhas%2F&psig=AOvVaw2wz7YQMaJS-q_4F0mNyc8c&ust=1717161939933000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=OCA8QjRxqFwoTCNCTxe28tYYDFQAAAAAdAAAAABAJ

Trabalho realizado pelos alunos da turma QV3A