


Aquila fasciata

ÁGUIA DE BONELLI



Sorata Fereira

A águia de Bonelli
de asas bastante lar-

gas e arredondadas, cuca comprida e cabeça proporcio-
nalmente pequena. Em voo mantém as asas planas.
Os adultos distinguem-se pelo seu corpo claro e asas
e cauda escuras. As fêmeas são maiores que os ma-
chos.



Ana Gabriela Nunes


Coenocya sintrana



*Euphydryas
aurinia*

BORBOLETA
DE OURO

O sapo-comum tem hábitos predominantemente humanos
noturnos, tem a particularidade de se deslocar por pequenas
corridas. Encontrado em zonas arboradas e zonas de charco,
as mesmas para aparecer também em outros habitats como zo-
nas de alta montanha, especialmente em locais abertos, com
áreas pouco compactadas. Durante a reprodução, utiliza
preferencialmente pequenos charcos temporários de escassa
profundidade. Se alimenta de escaravêlhos, minis-
culhões e larvas de insetos. As larvas são essencial-
mente herbívoras e detritívoras. O sapo-corredor tem
um comportamento reprodutivo explosivo em que machos
e fêmeas se concentram junto aos charcos para acasalar,
apenas uma ou duas vezes, logo após grandes chuvas.
Os sapos-corredores voltam ao mesmo charco uma
vez mais para se repro-
duzirem.



Sorata

Rafaela Martins